

KELIAUTOJAMS REKOMENDUOJAMA IMUNOPROFILAKTIKA

Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų ligų - skiepai. Prieš vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų sužinoti apie užkrečiamųjų ligų riziką ir galimas profilaktikos priemones. Pasiskiepijus tik po tam tikro laikotarpio susidaro pakankamas imunitetas. Šis laikotarpis priklauso: nuo kokios ligos skiepijama, kiek kartų reikia skiepyti, ar žmogus nuo šios ligos buvo skiepytas anksčiau. Todėl dėl skiepų į medikus reikia kreiptis likus 4-6 savaitėms iki kelionės. Skiepytis rekomenduojama atsižvelgiant į: kurią šalį keliaujama, kelionės trukmę, gyvenimo toje šalyje sąlygas, keliautojo amžių, sveikatos būklę, ankstesnius skiepėjimus, skiepų kainą.

Skiepėjimai keliautojams sąlyginai skirstomi taip:

Kategorija	Užkrečiamoji liga
1. Planiniai skiepėjimai	Difterija/stabligė/kokliušas Hepatitas B B tipo Haemophilus influenzae infekcija Tymai Poliomielitas
2. Rekomenduojami skiepėjimai	Cholera Gripas Hepatitas A Hepatitas B Meningokokinė infekcija Pneumokokinė infekcija Pasiutligė Erkinis encefalitas Vidurių šiltinė Geltonasis drugys
3. Privalomieji skiepėjimai	Geltonasis drugys Meningokokinė infekcija: vykstantiesiems į Meką (Saudo Arabija)

Privalomuosius skiepėjimus reglamentuoja Tarptautinės sveikatos taisyklės. Skiepijant nuo geltonojo drugio, siekiama dviejų tikslų: apsaugoti keliautojus nuo susirgimo geltonuoju drugiu ir apsaugoti šalis nuo šios ligos įvežimo galimybės.

Nuo meningokokinės infekcijos privalu skiepytis piligrimams, vykstantiems į Meką (Hadžį, Umrą), kai kuriose šalyse - grįžtantiems iš šios vietovės.

Apie visus atliktus skiepus turėtų būti pažymėta Tarptautiniame skiepėjimų sertifikate.

Informacija apie užkrečiamąsias ligas, nuo kurių skiepijama

CHOLERA

Paplitimas

Cholera daugiausia registruojama besivystančiose šalyse, kur yra blogos sanitarinės sąlygos ir trūksta geriamo vandens, bei karo nuniokotose teritorijose. Išsivysčiusiose šalyse pasitaiko tik įvežtinių atvejų.

Rizika keliautojams

Pagrindinė profilaktikos priemonė - tinkamai pasirinkti maistą ir vandenį. Rizika užsikrėsti cholera keliautojams labai maža net ir tose šalyse, kur registruojami susirgimai. Didelė rizika gali būti tik humanitarinę pagalbą teikiantiems darbuotojams stichinių nelaimių vietovėse, pabėgėlių stovyklose ir pan.

Skiepijimas

Skiepytis gali būti rekomenduojama tik tiems, kuriems yra ypač didelė rizika užsikrėsti. Rekomenduojama tik geriamoji vakcina nuo choleros. Inaktyvinta geriamoji choleros vakcina pasižymi tam tikru apsauginiu poveikiu ir prieš E.Coli ir kartu - "keliautojų diarėją". Vis tik šios vakcinos efektyvumas yra trumpalaikis (tik pirmuosius 6 mėn. jis siekia 80-85%), todėl net ir pasiskiepijus būtina vengti nesaugaus maisto ir vandens.

DIFTERIJA

Paplitimas

Difterija paplitusi visame pasaulyje, tačiau dėl ilgalaikių planinių skiepimų retai nustatoma ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse. 10-ajame dešimtmetyje difterijos epidemija buvo registruota Rytų Europos šalyse.

Rizika keliautojams

Šia liga gali užsikrėsti nepilnai paskiepyti ar neskiepyti asmenys.

Skiepijimas

Skiepai nuo difterijos rekomenduojami atsižvelgiant į paciento amžių (pagal skiepimų kalendorių, revakcinacija - kas 10 metų).

ERKINIS ENCEFALITAS

Paplitimas

Paplitęs kai kuriose Europos šalyse, ypač Baltijos valstybėse, Austrijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Slovėnijoje, Šiaurės Rytų Lenkijoje, Rusijoje.

Rizika keliautojams

Keliautojai gali užsikrėsti endeminėse teritorijose sezono metu (paprastai – nuo pavasario iki ankstyvo rudens), ypač stovyklaudami gamtoje (kaimo ir miškingose vietovėse).

Skiepijimas

Skiepijama inaktyvinta erkinio encefalito vakcina.

GELTONASIS DRUGYS

Paplitimas

Paplitęs kai kuriose Afrikos bei Centrinės ir Pietų Amerikos šalyse (žr. 1 pav.).

Rizika keliautojams

Galima užsikrėsti endeminėse teritorijose, ypač jei lankomasi neurbanizuotose, miškingose teritorijose (džiunglėse) arba miestuose protrūkių metu. Riziką galima šiek tiek sumažinti taikant saugos priemones nuo moskitų įkandimų.

Skiepijimas

Skiepytis rekomenduojama visiems vykstantiesiems į endemines geltonojo drugio šalis (kuriose yra geltonojo drugio plitimo rizika) (žr. 1 pav.)

Geltonojo drugio endeminės teritorijos (pagal PSO):


- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Afrikoje:</i> Angola, Beninas^S, Bisau-Gvinėja, Burkina Faso^S, Burundis, Centrinės Afrikos Respublika^S, Čadas, Dramblio Kaulo Krantas^S, Etiopija, Gabonas^S, Gambija, Gana^S, Gvinėja, Kamerūnas^S, Keip Verdas, Kenija, Kongas^S, Kongo Demokratinė Respublika^S (anksčiau Zairas), Liberija^S, Malis^S, Mauritanija, Nigerija, Nigeris^S, Pusiaujo Gvinėja, Ruanda^S, San Tomė ir Prinsipė^S, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Tanzanija, Togas^S, Uganda.▪ <i>Centrinėje ir Pietų Amerikoje:</i> Bolivija, Brazilija, Ekvadoras, Gviana, Kolumbija, Panama, Peru, Prancūzijos Gviana^S, Surinamas, Trinidadas ir Tobagas, Venesuela. |
|---|

^Sšalys - geltonojo drugio endeminės teritorijos, kuriose iš visų atvykstančiųjų, vyresnių kaip 6 mėn.-1 metų, reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato.

Kai kuriose pasaulio šalyse skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš atvykstančiųjų iš infekuotų teritorijų ir keliavusiųjų tranzitu per jas (nereikalaujama atvykstant iš Lietuvos ar iš kitų Europos šalių). Dauguma skiepimo sertifikato reikalaujančių šalių naudojami PSO paskelbtu geltonojo drugio endeminių teritorijų sąrašu, kitos yra sudariusios savo teritorijose naudojamus ir nuolat papildomus infekuotų šalių sąrašus (žr. Šalių (teritorijų) sąrašą ir išvykstantiems į jas rekomenduojamus/ būtinus skiepus bei maliarijos profilaktiką).

Skiepijama gyva geltonojo drugio vakcina (efektyvumas siekia iki 100%), revakcinuojama po 10 metų. Neskiepijami jaunesni kaip 9 mėn. kūdikiai, nėščios moterys.

1 pav. Geltonojo drugio endeminės teritorijos, PSO, 2002m.



GRIPAS

Paplitimas

Paplitęs visame pasaulyje.

Rizika keliautojams

Vykstantieji į šalis, kur registruojamas padidėjęs sezoninis sergamumas gripu, gali susirgti šia liga. Keliaujantiems gripo rizika yra didesnė, nes jie daugiau būna uždaroje patalpoje bei dažniau lankosi žmonių susibūrimo vietose. Gripo rizikos grupei priskiriami senyvi žmonės, taip pat sergantieji lėtinėmis kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių sistemos, inkstų ligomis, cukriniu diabetu, asmenys, kuriems dėl kokių nors priežasčių susilpnėjusi imuninė sistema, bei sveikatos priežiūros darbuotojai.

Skiepijimas

Gripo viruso antigeninės savybės nuolat kinta, todėl kiekvienais metais kuriama naujos sudėties gripo vakcina. Paprastai skiepytis rekomenduojama likus 2 savaitėms iki išvykimo. Šiaurės ir Pietų pusrutuliuose gripo sezonai būna skirtingu metu (Šiaurės pusrutulyje – lapkričio-kovo mėn., Pietų pusrutulyje – balandžio – rugsėjo mėn.), be to, gali skirtis ir cirkuliuojančių virusų antigeninė struktūra, todėl prieš skiriant vakciną rekomenduojama atsižvelgti, į kurį pusrutulį keliaujama. Geriausia, jei rizikos grupių asmenys, vykstantys iš Šiaurės į Pietų pusrutulį prieš prasidedant (arba ką tik prasidėjus) gripo sezonui, pasiskiepys iš karto atvykę tam pusrutuliui skirta vakcina.

B TIPO HAEMOPHILUS INFLUENZAE INFEKCIJA

Paplitimas

Paplitusi visame pasaulyje. Šalyse, kur planine tvarka skiepijami kūdikiai ir vaikai, retai registruojami susirgimai šia liga.

Rizika keliautojams

Gali užsikrėsti ir susirgti jaunesni kaip 5 metų amžiaus vaikai, ypač ekonomiškai išsivysčiusių šalių, vykstantys į mažiau išsivysčiusias šalis.

Skiepijimas

Kūdikiams ir vaikams skiepijami pagal skiepijimų kalendorių.

HEPATITAS A

Paplitimas

Hepatitis A paplitęs visame pasaulyje, išskyrus Šiaurės Amerikos, Šiaurės ir Vakarų Europos, kai kurias Pietų ir Rytų Europos šalis, Australiją, Japoniją.

Rizika keliautojams

Hepatitis A - viena dažniausių užkrečiamųjų ligų, kuriomis gali užsikrėsti keliautojai. Ji ypač aktuali išsivysčiusių šalių gyventojams, vykstantiems į mažiau išsivysčiusias šalis. Didelė rizika yra keliautojams, kurie gyvena blogomis sanitarinėmis sąlygomis ar neturi galimybių vartoti tik saugų geriamąjį vandenį.

Skiepijimas

Skiepai nuo hepatito A rekomenduojami visiems vykstantiesiems į endemines hepatito A teritorijas. Saugi ir labai efektyvi hepatito A vakcina vartojama nuo 1992 m. Skiepijama likus 4 savaitėms iki kelionės, antroji dozė skiriama po 6-24 mėn. Tokia skiepijimo schema užtikrina imunitetą ne mažiau kaip 10 metų.

HEPATITAS B

Paplitimas

Paplitęs daugelyje pasaulio šalių, išskyrus kai kurias Amerikos, Šiaurės ir Vakarų Europos šalis, Australiją, Naująją Zelandiją.

Rizika keliautojams

Potenciali hepatito B rizika yra visiems į endemines hepatito B šalis išvykstantiems keliautojams, nes kiekvienam, ypač išvykstančiam ilgesniam laikui, gali prireikti medicinos pagalbos. Ypač didelė hepatito B rizika yra asmenims, kontaktuojantiems su krauju ar kitais žmogaus organizmo skysčiais, turintiems nesaugių lytinių santykių. Rizikos grupei priskiriami sveikatos priežiūros darbuotojai, kontaktuojantys su pacientų krauju, asmenys, kuriems perpilama kraujo, atliekamos operacijos, įvairios medicininės ar kitos procedūros (akupunktūra, tatuiruotės ir kt.), bei vartojantieji intraveninius narkotikus. Besivystančiose šalyse hepatitis B gali plisti ir tiesioginio kontakto būdu, ypač jei yra nedidelių odos pažeidimų.

Skiepijimas

Naujagimiai ir kūdikiai skiepijami pagal skiepijimų kalendorių.

Neskiepytiems asmenims skiriamos 3 vakcinų dozės (standartinė schema: pirmoji dozė, po 1 mėn. ir po 6-12 mėn.). Kadangi hepatitui B būdingas ilgas inkubacinis periodas, pirmosios dvi vakcinų dozės gali būti skiriamos prieš kelionę, trečioji - grįžus iš jos.

Jei kelionė labai ilga, gali būti taikomos sutrumpintos skiepijimo schemas: pirmoji dozė, po 1 mėn. ir po 2 mėn. arba pirmoji dozė, po 7 dienų ir po 21 dienos. Jei taikoma sutrumpinta skiepijimo schema, po 6-12 mėn. rekomenduojama skirti dar vieną vakcinų dozę.

Keliautojai, kuriems yra rizika užsikrėsti hepatito A ir hepatito B virusais, gali būti skiepijami sudėtine hepatito A ir hepatito B vakcina.

KOKLIUŠAS

Paplitimas

Paplitęs visame pasaulyje, kasmet registruojama apie 20 mln. kokliušo atvejų, dauguma jų - besivystančiose šalyse.

Rizika keliautojams

Gali susirgti neskiepyti ar nepilnai paskiepyti vaikai.

Skiepijimas

Kūdikiams ir vaikams skiepijami pagal skiepijimų kalendorių.

MENINGOKOKINĖ INFEKCIJA

Paplitimas

Meningokokinė infekcija protrūkiškai ir epidemijomis pasireiškia kai kuriose į pietus nuo Sacharos esančiose Afrikos šalyse, priklausančiose vadinamajam “meningokokiniam diržui”. Protrūkiškai šiose šalyse dažniausiai kyla lapkričio-birželio mėnesiais, juos sukelia A serogrupės meningokokai.

Pavieniai meningokokinės infekcijos atvejai bei lokalūs C serogrupės meningokokų protrūkiškai galimi ir kitose šalyse, ypač jei susidaro palankios sąlygos sukėlėjui plisti (pvz., gyvenama perpildytose patalpose).

Rizika keliautojams ir skiepijimas

Skiepytis nuo meningokokinės infekcijos rekomenduojama visiems vykstantiesiems į šalis, kuriose registruojama meningokokinės infekcijos protrūkių, ypač tiems, kurie tose šalyse gyvens ilgiau ir bendraus su vietiniais gyventojais. Piligrimai, vykstantys į Mėką, turėtų būti skiepijami keturvalente meningokokinės infekcijos vakcina (A, C, Y, W135).

PASIUTLIGĖ

Paplitimas

Paplitusi visame pasaulyje, išskyrus Skandinaviją, Didžiąją Britaniją, Australiją, Naująją Zelandiją, Japoniją.

Rizika keliautojams

Pasiutligės rizika priklauso nuo galimybės susidurti su pasiutusiais gyvūnais. Paprastai keliautojai šia liga užsikrečia labai retai, nebent kelionė susijusi su tam tikru darbu.

Skiepijimas

Profilaktiškai skiepytis nuo pasiutligės rekomenduojama asmenims, kurių darbas susijęs su rizika užsikrėsti pasiutlige.

PNEUMOKOKINĖ INFEKCIJA

Paplitimas

Pneumokokinė infekcija paplitusi visame pasaulyje.

Rizika keliautojams

Keliautojams, sergantiems lėtinėmis ligomis (pvz.: hemoglobinoopatija, lėtiniu inkstų nepakankamumu, lėtinėmis kepenų ligomis, po organų transplantacijos, asplėnija, cukriniu diabetu, ŽIV nešiojimu ir kt.), rekomenduojama skiepytis pneumokokinės infekcijos vakcina.

Skiepijimas

Skiepijama polisacharidine vakcina, kurios sudėtyje yra 23 serologinių grupių pneumokokų antigenų. Vakcina rekomenduojama rizikos grupės vyresniems kaip 2 metų amžiaus asmenims. Naujos kartos konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina gali būti skiriama ir jaunesniems kaip 2 metų vaikams.

POLIOMIELITAS

Paplitimas

Poliomielito virusas išnaikintas daugelyje pasaulio šalių, išskyrus kai kurias Azijos bei Afrikos šalis.

Rizika keliautojams

Kol dar poliomielito virusas cirkuliuoja, vykstantieji į endemines poliomielito šalis turi būti paskiepyti nuo šios ligos.

Skiepijimas

Kūdikiai ir vaikai skiepijami pagal skiepimų kalendorių. Anksčiau skiepytiems keliautojantiems į endemines teritorijas prieš kelionę skiriama viena vakcinės dozė.

TYMAI

Paplitimas

Infekcija paplitusi visame pasaulyje, išskyrus labai ekonomiškai išsivysčiusias šalis. Vietinio viruso cirkuliacija praktiškai nutraukta JAV.

Rizika keliautojams

Neturintys imunizacijos keliautojai besivystančiose šalyse gali užsikrėsti šia liga.

Skiepijimas

Skiepijami pagal skiepijimų kalendorių. Vaikai ir suaugusieji, neskiepyti ar neturintys duomenų apie skiepijimą, skiepijami trivalente tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina.

STABLIGĖ

Paplitimas

Užsikrėsti galima bet kurioje šalyje, jei susižeidžiama ir žaizda užteršiama stabligės sporomis.

Rizika keliautojams

Keliautojai turėtų būti apsaugoti nuo stabligės, nes bet koks sužeidimas kelionės metu gali būti šios ligos priežastis.

Skiepijimas

Nuo stabligės skiepijama atsižvelgiant į amžių (pagal skiepijimų kalendorių, revakcinacija kas 10 metų). Susižeidus skiriama skubioji stabligės imunoprofilaktika.

VIDURIŲ ŠILTINĖ

Paplitimas

Paplitusi visame pasaulyje, ypač kur blogos sanitarinės sąlygos, nesilaikoma mitybos higienos reikalavimų, nekokybiškai valomi nutekamieji vandenys.

Rizika keliautojams

Keliautojai, vykstantys į endemines vidurių šiltinės teritorijas (Pietų Aziją, kai kurias Šiaurės ir Vakarų Afrikos šalis, Peru) gali užsikrėsti šia liga. Net ir skiepytiems asmenims reikia vengti galimai užteršto maisto ir vandens. Tačiau viešbučiuose ir kitose įstaigose, kur geros sanitarinės sąlygos ir laikomasi mitybos higienos reikalavimų, rizika maža.

Skiepijimas

Skiepytis nuo vidurių šiltinės rekomenduojama keliaujantiems į endemines šalis, ypač jei ten praleidžiama ilgiau kaip mėnesį, jei neužtikrinamos higieniškos gyvenimo ir mitybos sąlygos, jei vykstama į Indijos subkontinento šalis, kur galimos antibiotikams atsparios vidurių šiltinės sukėlėjo formos.

Skiepijama geriamąja gyva susilpninta arba į raumenis švirkščijama polisacharidine Vi kapsuline vakcina. Polisacharidine Vi kapsuline vakcina skiepijami vyresni kaip 2 metų vaikai, papildoma dozė skiriama kas 3 metai.

Šalių (teritorijų) sąrašas ir išvykstantiems į jas rekomenduojami/ būtini skiepai bei maliarijos profilaktika

Maliarijos chemioprofilaktikai nurodomi medikamentai: CHL - chlorochinas, C+P - chlorochinas ir prokvanilas, MEF - meflokinas, DOX - doksaciklinas.

Pastaba. Nurodyti tik tie rizikos veiksniai (infekcijos), kurių galima išvengti pasiskiepijus. Kaip rizikos veiksniai (infekcijos) nenurodyta difterija, stabligė, tymai. Nuo difterijos ir stabligės, atsižvelgiant į ankstesnius skiepus, turėtų būti paskiepyti visi keliautojai (anksčiau nuo difterijos ir stabligės skiepytiems asmenims kas 10 metų skiriama revakcinacija).

AFGANISTA- NAS	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepijimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika užsikrėsti gegužės-lapkričio mėn. teritorijose, esančiose žemiau 2000 m virš jūros lygio. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> C+P.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B.
AIRIJA	Nėra privalomų skiepijimų reikalavimų keliautojams.
ALBANIJA	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepijimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
ALŽYRAS	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų,

	reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Maliarija. Rizika labai nedidelė. <i>Profilaktika nerekomenduojama</i> Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
AMERIKOS SAMOA	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė.
ANDORA	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.
ANGILA	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
ANGOLA	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Maliarija. Rizika užsikrėsti visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
ANTIGVA IR BARBUDA	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
ARGENTINA	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams. Maliarija. Rizika nedidelė, tik kaimo teritorijose ties siena su Bolivija ir Paragvajumi. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose:</i> CHL. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A.
ARMĖNIJA	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams. Maliarija. Rizika tik birželio-spalio mėn. kai kuriose teritorijose Ararato slėnyje; turistų lankomos vietovės nepavojingos. <i>Profilaktika nerekomenduojama.</i> Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
AUSTRALIJA	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, kurie atvyksta į Australiją nepaėjęs 6 dienoms po lankymosi (1 parą ar >) infekuotose šalyse, nurodytose PSO savaitiniame leidinyje <i>Weekly Epidemiological Record</i> , reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
AUSTRIJA	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.
AZERBAIDŽANAS	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams. Maliarija. Nedidelė rizika birželio-rugsėjo mėn. kai kuriose žemose vietovėse tarp Kuros ir Arakso upių. <i>Profilaktika nerekomenduojama.</i> Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
BAHAMOS	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
BAHREINAS	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
BALTARUSIJA	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B, difterija.
BANGLADEŠAS	Geltonasis drugys. Iš atvykstančiųjų iš infekuotų teritorijų reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Kiekvienas asmuo (taip pat ir kūdikis), atvykstantis oro ar jūrų transportu nepaėjęs 6 dienoms po išvykimo iš infekuotos teritorijos ar vykęs tranzitu per ją ir neturintis skiepavimo sertifikato, izoliuojamas 6 dienoms pagal šalyje galiojančias taisykles. Bangladeše infekuotomis laikomos šios šalys: Afrikoje: Angola, Beninas, Burkina Faso, Burundis, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Dramblio Kaulo Krantas, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Gvinėja-Bisau, Kamerūnas, Kenija, Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Liberija, Malavis, Malis, Mauritanija, Nigeris, Nigerija, Pusiaujo Gvinėja, Ruanda, San Tomė ir Princiņė, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Sudanas (pietinė dalis), Tanzanija, Togas, Uganda, Zambija; Amerikoje: Belizas, Bolivija, Brazilija, Ekvadoras, Gvatemala, Gviana, Hondūras, Kolumbija, Kosta Rika, Nikaragva, Panama, Peru, Prancūzijos Gviana, Surinamas, Trinidasas ir Tobagas, Venesuela. Pastaba. Šis sąrašas gali būti papildomas, jei pranešama apie geltonojo drugio atvejį į sąrašą neįtrauktoje šalyje. Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje, išskyrus Daką. Pietryčiuose registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B.
BARBADOSAS	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
BELGIJA	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.

BELIZAS	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visoje šalies teritorijoje, ypač pietiniuose regionuose. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> CHL.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
BENINAS	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš visų vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių į šalį, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija, poliomielitas.
BERMUDŲ SALOS	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.
BISAU GVINĖJA	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Bisau-Gvinėje infekuotomis laikomos šios šalys: Afrikoje: Angola, Beninas, Burkina Faso, Burundis, Kep Verdas, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Kongas, Dramblio Kaulo Krantas, Kongo Demokratinė Respublika, Džibutis, Pusiaujo Gvinėja, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Kenija, Liberija, Madagaskaras, Malis, Mauritanija, Mozambikas, Nigeris, Nigerija, Ruanda, San Tomė ir Principė, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Togas, Uganda, Tanzanija, Zambija; Amerikoje: Bolivija, Brazilija, Colombija, Ekvadoras, Prancūzijos Gviana, Gviana, Panama, Peru, Surinamas, Venesuela.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija, poliomielitas.
	<i>Žr. Mianmaras</i>
BOLIVIJA	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus kai kuriose teritorijose, esančiose žemiau 2500 m virš jūros lygio. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksiniui- pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose:</i> CHL, šiaurinėje teritorijoje - MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
BOSNIJA IR HERCEGOVINA	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B..
BOTSVANA	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika lapkričio-gegužės/birželio mėn. šiaurinėse šalies teritorijose. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose:</i> MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
BRAZILIJA	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiesiems į endemines teritorijas (į kaimo vietoves Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins valstijose ir į kai kurias Minas Gerais, Parana, São Paulo teritorijas) rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš vyresnių kaip 9 mėn. keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato (išskyrus, kai šis skiepavimas yra kontraindikuotinas dėl medicininių priežasčių). Brazilijoje infekuotomis laikomos šios šalys: Afrikoje: Angola, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Kamerūnas, Kongo Demokratinė Respublika, Liberija, Nigerija, Siera Leonė, Sudanas; Amerikoje: Bolivija, Ekvadoras, Kolombija, Peru.
	Maliarija. Didelė rizika visus metus miškingose teritorijose, esančiose žemiau 900 m virš jūros lygio “Legal Amazonia” regione (9 valstijose: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão (vakarinė dalyje), Mato Grosso (šiaurinėje dalyje), Pará (išskyrus Belemo miestą), Rondônia, Roraima ir Tocantins). Didžiausia rizika – džiunglių teritorijose, tačiau užsikrėsti galima netgi kai kurių miestų (Pôrto Velho, Boa Vista, Macapá, Manaus, Santarém and Maraba) pakraščiuose. Registruotas atsparumas įvairiems priešmaliariniais vaistams. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose:</i> MEF.
	Rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.
BRITŲ VIRDZINIJS SALOS	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A.
BRUNĖJAUS	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų ar per 6

DARUSALAMAS	pastarąsias dienas buvusių endeminėse šalyse, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
BULGARIJA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
BURKINA FASO	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį būtina pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš visų vyresnių kaip 1 metų keliautojų reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
BURUNDIS	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui- pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B.
BUTANAS	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika penkiuose pietiniuose rajonuose visus metus. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui- pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose:</i> MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B.
CENTRINĖS AFRIKOS RESPUBLIKA	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį būtina pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš visų vyresnių kaip 1 metų keliautojų reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui- pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
ČADAS	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Visiems vyresniems kaip 1 metų keliautojams rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
ČEKIJA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
ČILĖ	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A.
DANIJA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
DOMINIKA	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
DOMINIKOS RESPUBLIKA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Maliarija. Nedidelė rizika visus metus, ypač kai kuriose vakarinės dalies provincijų kaimo vietovėse. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose:</i> CHL.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
DRAMBLIO KAULO KRANTAS	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį būtina pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš visų vyresnių kaip 1 metų keliautojų reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui- pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
DŽIBUTIS	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija, poliomielitas.
EGIPTAS	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Egipte infekuotomis laikomos šios šalys: Afrikoje: Angola, Beninas, Burkina Faso, Burundis,

	<p>Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Dramblio Kaulo Krantas, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Bisau-Gvinėja, Kamerūnas, Kenija, Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Liberija, Malis, Nigeris, Nigerija, Pusiaujo Gvinėja, Ruanda, San Tomė ir Principė, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Tanzanija, Togas, Uganda, Zambija; Amerikoje: Belizas, Bolivija, Brazilija, Ekvadoras, Gviana, Kolumbija, Kosta Rika, Panama, Peru, Prancūzijos Gviana, Surinamas, Trinidadas ir Tobagas, Venesuela.</p> <p>Maliarija. Labai nedidelė rizika birželio-spalio mėn. al Fajumo teritorijoje (susirgimų neregistruota nuo 1998 m.). <i>Profilaktika nerekomenduojama.</i></p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, poliomielitas.</p>
EKVADORAS	<p>Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, ir iš Ekvadoro gyventojų, išvykstančių į infekuotas teritorijas, reikalaujama skiepijimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus teritorijose, esančiose žemiau kaip 1500 m virš jūros lygio. Esmeraldos provincijoje registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: CHL, Esmeraldos provincijoje - MEF.</i></p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
ERITRĖJA	<p>Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepijimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje, esančioje žemiau kaip 2200 m virš jūros lygio, išskyrus Asmarą. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui- pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika: MEF.</i></p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.</p>
ESTIJA	Nėra privalomų skiepijimų reikalavimų keliautojams.
ETIOPIJA	<p>Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepijimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje žemiau kaip 2000 m virš jūros lygio, išskyrus Adis Abebą. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika: MEF.</i></p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.</p>
FARERŲ SALOS	Nėra privalomų skiepijimų reikalavimų keliautojams.
FIDŽIS	<p>Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, per paskutines 10 dienų apsilankiusių infekuotose teritorijose, reikalaujama skiepijimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A.</p>
FILIPINAI	<p>Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepijimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus teritorijose, esančiose žemiau kaip 600 m virš jūros lygio, išskyrus Aklan, Bilaran, Bohol, Camiguin, Capi, Catanduanes, Cebu, Guimaras, Iloilo, Leyte, Maskate, Samar, Sequijor provincijas, Manilą ir kitas tankiai gyvenamas teritorijas. Registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas CHL, sulfadoksinui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: MEF.</i></p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
FOLKLENDŲ (MALVINŲ) SALOS	<p>Nėra privalomų skiepijimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.</p>
GABONAS	<p>Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį būtina pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš visų vyresnių kaip 1 metų keliautojų reikalaujama skiepijimo sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui- pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika: MEF.</i></p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.</p>
GAMBIJA	<p>Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš endeminių ir infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepijimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui- pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika: MEF.</i></p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija, poliomielitas.</p>
GANA	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį būtina pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš visų keliautojų reikalaujama skiepijimo nuo geltonojo drugio sertifikato.

	<p>Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui- pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija, poliomielitas.</p>
GIBRALTARAS	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
GRAIKIJA	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A (dalyje teritorijos).</p>
GRENADA	<p>Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.</p>
GRENLANDIJA	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.</p>
GRUZIJA	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Maliarija. Ribota rizika liepos-spalio mėn. kai kuriuose pietrytinės šalies dalies kaimuose. <i>Profilaktika nerekomenduojama.</i></p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.</p>
GUAMAS	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė.</p>
GVADELUPĖ	<p>Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
GVATEMALA	<p>Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus teritorijose, esančiose žemiau kaip 1500 m virš jūros lygio. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose:</i> CHL.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
GVIANA	<p>Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Gvianoje infekuotomis laikomos šios šalys: Afrikoje: Angola, Beninas, Burkina Faso, Burundis, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Dramblio Kaulo Krantas, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Gvinėja-Bisau, Kamerūnas, Kenija, Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Liberija, Malis, Nigeris, Nigerija, Ruanda, San Tomė ir Principė, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Tanzanija, Togas, Uganda; Amerikoje: Belizas, Bolivija, Brazilija, Ekvadoras, Gvatemala, Hondūras, Kolumbija, Kosta Rika, Nikaragva, Panama, Peru, Prancūzijos Gviana, Surinamas, Venesuela.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus vidurinėse šalies teritorijose. Pavienių atvejų buvo registruota tankiai gyvenamose pakrantės teritorijose. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose:</i> MEF.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
GVINĖJA	<p>Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija, poliomielitas.</p>
HAITIS	<p>Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus miškingose teritorijose. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose:</i> CHL.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.</p>
HONDŪRAS	<p>Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Didelė rizika visus metus kai kuriose šalies teritorijose, nedidelė rizika – San Pedro Suloje ir Tegusigalpoje. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> CHL.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.</p>
HONKONGAS (Specialusis administracinis Kinijos regionas)	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
INDIJA	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Asmenys (išskyrus kūdikius iki 6 mėn.), atvykstantys oro ar jūru

	<p>transportu nepraėjus 6 dienoms po lankymosi infekuotoje šalyje ar vykę tranzitu per jas ir neturintys skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikatų, gali būti izoliuojami 6 dienoms pagal Indijoje galiojančias taisykles.</p> <p>Indijoje infekuotomis laikomos šios šalys: Afrikoje: Angola, Beninas, Burkina Faso, Burundis, Kamerūnas, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Kongas, Dramblio Kaulo Krantas, Kongo Demokratinė Respublika, Pusiaujo Gvinėja, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Gvinėja-Bisau, Kenija, Liberija, Malis, Nigeris, Nigerija, Ruanda, San Tomė ir Principė, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Togas, Uganda, Tanzanija, Zambija.</p> <p>Amerikoje: Bolivija, Brazilija, Kolumbija, Ekvadoras, Prancūzijos Gviana, Gviana, Panama, Peru, Surinamas, Trinidadas ir Tobagas, Venesuela.</p> <p>Šis sąrašas gali būti papildomas, jei pranešama apie geltonojo drugio atvejį į sąrašą neįtrauktoje šalyje.</p>
	<p>Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje žemiau kaip 2000 m virš jūros lygio. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: C+P, Asame: MEF.</i></p>
	<p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.</p>
INDONEZIJA	<p>Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p>
	<p>Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje, išskyrus Džakartą, didelius miestus ir turistų lankomas Balio ir Javos salas. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui-pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: MEF.</i></p>
	<p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
IRAKAS	<p>Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p>
	<p>Maliarija. Rizika gegužės-lapkričio mėn. šiauriniuose šalies rajonuose, esančiuose žemiau kaip 1500 m virš jūros lygio, bei Basrah provincijoje. <i>Rekomenduojama profilaktika: CHL.</i></p>
	<p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
IRANAS	<p>Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Ribota rizika vasarą šiauriniuose Zagros kalnuose ir vakarinėse bei pietvakarinėse teritorijose; rizika kovo-lapkričio mėn. Hormozgan, Kerman (tropinėje dalyje) ir Sistan-Baluchestan provincijų kaimo vietovėse. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui-pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> šiauriniuose Zagros kalnuose ir vakarinėse bei pietvakarinėse teritorijose - CHL, Hormozgan, Kerman (tropinėje dalyje) ir Sistan-Baluchestan provincijose - C+P.</p>
	<p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
ISLANDIJA	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.
ISPANIJA	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.
ITALIJA	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.
IZRAELIS	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
JAMAIKA	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
JAPONIJA	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.
JEMENAS	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus, ypač rugsėjo-vasario mėn., visose teritorijose, esančiose žemiau kaip 2000 m virš jūros lygio, išskyrus Sana miestą. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika: C+P.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
JORDANIJA	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
JUGOSLAVIJA	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
JUNGTINĖ KARALYSTĖ	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.
JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.
	<p>Visose valstijose vaikams, pradantiems lankyti mokyklą, būtini skiepai nuo difterijos, tymų, poliomielito, raudonukės, daugelyje valstijų – ir nuo stabligės, kokliušo ir epideminio parotito. Skiepai nuo B tipo Haemophilus influenzae infekcijos daugelyje valstijų būtini prieš pradant lankyti ikimokyklinės vaikų įstaigas.</p>

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
KAIMANO SALOS	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
KALĖDŲ SALA	Geltonasis drugys. Žr. <i>Australija</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė.
KAMBODŽA	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje, išskyrus Pnompenį ir aplinkines teritorijas. Maliarija registruojama ir turistų lankomoje Angkor Wat vietovėje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksiniui - pirimetaminui, vakarinėse provincijose ties pasieniu su Tailandu – atsparumas MEF. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF, <i>vakarinėse provincijose</i> - DOX.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
KAMERŪNAS	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį būtina pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš visų vyresnių kaip 1 metų keliautojų reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksiniui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
KANADA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
KATARAS	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
KAZACHSTANAS	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
KEIP VERDAS	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš teritorijų (kuriose per pastaruosius 6 metus buvo registruota susirgimų geltonuoju drugiu), reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Ribota rizika rugsėjo-lapkričio mėn. Sao Tiago saloje. <i>Profilaktika nerekomenduojama.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
KENIJA	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje; maža rizika Nairobyje ir teritorijose, esančiose aukščiau kaip 2500 m virš jūros lygio. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksiniui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija, poliomielitas.
KINIJA	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika kai kurių šalies teritorijų (Hainan, Yunnan, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Sichuan, Xizang) kaimo vietovėse, esančiose žemiau 1500 virš jūros lygio. Labai nedidelė rizika - Anhui, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi ir Shandong teritorijose. Turistams, lankantiems tik miesto ir tankiai gyvenamas teritorijas, profilaktika paprastai nereikalinga. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose:</i> CHL; Hainan ir Yunnan teritorijose - MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
KIPRAS	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
KIRGIZIJA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Maliarija. Rizika birželio-rugsėjo mėn. kai kuriose pietinėse ir vakarinėse teritorijose ties pasieniu su Tadžikistanu ir Uzbekistanu. <i>Profilaktika nerekomenduojama.</i>
KIRIBATIS	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
KOLUMBIJA	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė.
	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Viesiems keliautojams, vykstantiems į Kolumbijos endemines geltonojo drugio teritorijas (Magdalenos upės vidurio slėnį, rytines ir vakarines Kordiljerų prieškalnes nuo Ekvadoro iki Venesuelos pasienio, Urabą, Siera Nevados prieškalnes,

	<p>rytų lygumas ir Amazonija), rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus kaimo/džiunglių teritorijose, esančiose žemiau 800 m virš jūros lygio. Amazonės ir kai kuriuose kituose regionuose registruotas atsparumas CHL, sulfadoksiniui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose:</i> C+P, Amazonės, Ramiojo vandens pakrantės ir Uraba-Bajo Cauca teritorijose - MEF.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
KOMORAI	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
KONGAS	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį būtina pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš visų vyresnių kaip 1 metų keliautojų reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksiniui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA (anksčiau ZAIRAS)	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį būtina pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš visų vyresnių kaip 1 metų keliautojų reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksiniui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
KORĖJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA (ŠIAURĖS KORĖJA)	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Maliarija. Ribota rizika kai kuriose pietinėse teritorijose. <i>Profilaktika nerekomenduojama.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
KORĖJOS RESPUBLIKA (PIETŲ KORĖJA)	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Maliarija- Ribota rizika kai kuriose šiaurinėse teritorijose. <i>Profilaktika nerekomenduojama.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
KOSTA RIKAI	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Maliarija. Vidutinė rizika visus metus Los Chiles (Alajuela provincijoje), Matina, Talamanca (Limón provincijoje) teritorijose; nedidelė rizika - Guanacaste ir Heredia bei likusiose Alajuela ir Limón provincijų dalyse. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose:</i> CHL.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
KROATIJA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
KUBA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
KUKO SALOS	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A.
KUVEITAS	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
LAOSAS	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje, išskyrus Vientiane. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
LATVIJA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
LENKIJA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
LESOTAS	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
LIBANAS	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
LIBERIJA	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį būtina pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš visų vyresnių kaip 1 metų keliautojų reikalaujama skiepavimo sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL,

	sulfadoksinui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija, poliomielitas.
LIBIJA	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
LICHTENŠTEINAS	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
LIETUVA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
LIUKSEMBURGAS	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
MADAGASKARAS	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams. Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje, ypač pakrantės teritorijose. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
MAJOTAS	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams. Maliarija. Rizika visus metus. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
MAKAO (Specialusis administracinis Kinijos regionas)	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
MAKEDONIJA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
MALAIZIJA	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, vyresnių kaip 1 metų, per paskutines 6 dienas buvusių infekuotose teritorijose, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Maliarija. Riboti maži maliarijos židiniai atokiose vietovėse, rizikos nėra miestuose ir pakrantės teritorijose. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose:</i> MEF. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
MALAVIS	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
MALDYVAI	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B.
MALIS	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija (pietinė dalis). Vykstantiems į šalį būtina pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš visų vyresnių kaip 1 metų keliautojų reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL sulfadoksinui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija, poliomielitas.
MALTA	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 9 mėn. keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Jei būtina, jaunesni kaip 9 mėn. kūdikiai, atvykstantys iš infekuotų teritorijų, gali būti izolijuojami ar stebimi. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A.
MAROKAS	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams. Maliarija. Labai nedidelė rizika gegužės-spalio mėn. kai kuriose Chefchaouen provincijos kaimo vietovėse. <i>Profilaktika nerekomenduojama.</i> Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
MARŠALO SALOS	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė.
MARTINIKA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams. Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
MAURICIJUS	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.

	<p>Maliarija. Rizika tik kai kuriose kaimo vietovėse. <i>Profilaktika nerekomenduojama.</i></p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija.</p>
MAURITANIJA	<p>Geltonasis drugys. Endeminė teritorija (pietinė dalis). Vykstantiems į šalį rekomenuojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš visų vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų ir šalyje praleidžiančių daugiau kaip 2 savaites, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p>
	<p>Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje, išskyrus šiaurinius rajonus: Dakhlet-Nouadhibou ir Tiris-Zemour. Liepos- spalio mėn. (liūčių laikotarpiu) maliarijos rizika - Adrar ir Inchiri teritorijose. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: C+P.</i></p>
	<p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija.</p>
MEKSIKA	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija- Rizika visus metus kai kuriose kaimo vietovėse, retai lankomose turistų, didelė rizika- Chiapas, Quintana Roo, Sinaloa, Tobasco, vidutinė rizika - Chihuahua, Durango, Nayarit, Oaxaca, Sonora, maža rizika - Campeche, Guerrero, Michoacan, Jalisco. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: CHL.</i></p>
	<p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.</p>
MIKRONEZIJA	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.</p>
MIANMARAS (anksčiau BIRMA)	<p>Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p>
	<p>Maliarija. Rizika žemiau kaip 1000 m virš jūros lygio esančiose kai kuriose teritorijose įvairiu metu laiku. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF, rytinėje Šano valstijos dalyje - DOX.</p>
	<p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
MOLDOVA	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B, difterija.</p>
MONAKAS	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
MONGOLIJA	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p>Rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.</p>
MONSERATAS	<p>Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p>
	<p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
MOZAMBIKAS	<p>Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p>
	<p>Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksiniui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.</p>
	<p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija.</p>
NAMIBIJA	<p>Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Jaunesni kaip 1 metų kūdikiai, atvykstantys iš infekuotų teritorijų, gali būti kurį laiką stebimi.</p>
	<p>Maliarija. Rizika lapkričio-gegužės/birželio mėn. šiauriniuose rajonuose ir visus metus prie Kavango ir Kunenės upių. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: C+P.</i></p>
	<p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
NAUJOJI KALEDONIJA	<p>Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p>
	<p><u>Pastaba.</u> Jei šalyje yra epidemijos pavojus, gali būti reikalaujama specialaus vakcinacijos sertifikato.</p>
	<p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A.</p>
NAUJOJI ZELANDIJA	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
NAURU	<p>Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p>
	<p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė.</p>
NEPALAS	<p>Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p>
	<p>Maliarija. Rizika visus metus kai kuriose kaimo vietovėse, ypač ties siena su Indija. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksiniui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: C+P.</i></p>
	<p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.</p>

NYDERLANDAI	<i>Žr. Olandija</i>
NIGERIJA	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika: MEF.</i>
NIGERIS	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija (pietinė dalis). Vykstantiems į šalį būtina pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš visų vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių į šalį, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika: MEF.</i>
NIKARAGVA	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Didelė rizika visus metus didesnėje šalies teritorijoje. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: CHL.</i>
NIUJĖ	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A.
NORVEGIJA	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.
OLANDIJA	Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.
OLANDŲ ANTILAI	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 6 mėn. keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
OMANAS	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Labai maža rizika atokiose Musandamo provincijos teritorijose (susirgimų neregistruota nuo 2001 m.). Registruotas atsparumas CHL. <i>Profilaktika nerekomenduojama.</i>
PAKISTANAS	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 6 mėn. keliautojų, atvykstančių iš endeminių teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato (kūdikams iki 6 mėn. būtinas motinos skiepavimo sertifikatas, įrodantis, kad ji buvo vakcinuota prieš kūdikio gimimą.)
PALAU	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje, esančioje žemiau kaip 2000 m virš jūros lygio. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika: C+P.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
PANAMA	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų ir endeminių teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Nedidelė rizika trijose provincijose- Toro, Darieno, San Blaso. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: CHL, rytinėse endeminėse teritorijose - MEF.</i>
PAPUA - NAUJOJI GVINĖJA	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš endeminių teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
PARAGVAJUS	Maliarija. Rizika kai kuriose šalies teritorijose (Alto Parana, Kaguazu, Kanendiju). <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: CHL.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
PERU	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalies rizikos teritorijas (miškingas teritorijas, esančias žemiau kaip 2300 m virš jūros lygio) rekomenduojama pasiskiepyti nuo

	<p>geltonojo drugio. Iš vyresnių kaip 6 mėn. keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika 21 iš 33 šalies rajonų: <i>P. Vivax</i> plitimas nustatytas Ayacucho, Cajamarca, Cerro de Pasco, Chachapoyas, Chanca-Andahuaylas, Cutervo, Cusco, Huancavelica, Jaen, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín, Tumbes ir Ucayali, <i>P. Falciparum</i> - Jaen, Lambayeque, Loreto, Luciano Castillo, Piura, San Martín, Tumbes ir Ucayali. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksiniui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> <i>P. vivax</i> rizikos teritorijose -CHL, <i>P. falciparum</i> rizikos teritorijose - MEF.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA	<p>Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus kai kuriose Mpumalangos provincijos, Šiaurės provincijos ir KwaZulu-Natal šiaurės rytinės dalies žemumose, didžiausia - spalio-gegužės mėn. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksiniui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose:</i> MEF.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.</p>
PITKERNO SALA	<p>Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A.</p>
PORTUGALIJA	<p>Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių į Azorų salas ar Madeirą iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p>
PRANCŪZIJA	<p>Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.</p>
PRANCŪZIJOS GVIANA	<p>Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį būtina pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš visų vyresnių kaip 1 metų keliautojų reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Didelė rizika visus metus teritorijose, besiribojančiose su Brazilija ir Surinamu. Registruotas atsparumas daugeliui priešmaliarinių vaistų teritorijose, kur vyksta migracija iš Brazilijos. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose:</i> MEF.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
PRANCŪZIJOS POLINEZIJA	<p>Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A.</p>
PUERTO RIKAS	<p>Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
PUSIAUJO GVINĖJA	<p>Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksiniui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.</p>
REJUNJONAS	<p>Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija.</p>
RYTŲ TIMORAS	<p>Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksiniui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF arba DOX.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
RUANDA	<p>Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį būtina pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš visų vyresnių kaip 1 metų keliautojų reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksiniui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika:</i> MEF.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.</p>
RUMUNIJA	<p>Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.</p>
RUSIJA	<p>Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B, difterija.</p>
SALIAMONO SALOS	<p>Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus, išskyrus kai kurias rytines ir pietines saleles. Registruotas</p>

	atsparumas CHL, sulfadoksinui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika: C+P.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė.
SALVADORAS	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 6 mėn. keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Labai maža rizika visus metus Santa Anos provincijoje, kaimo vietovėse dėl migracijos iš Gvatemalos. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: CHL.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
SAMOA	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė.
SAN MARINAS	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
SAN TOMĖ IR PRINSIPĖ	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį būtina pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš visų vyresnių kaip 1 metų keliautojų reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika: MEF.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
SAUDO ARABIJA	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus pietiniame šalies regione ir vakarų regiono kaimo vietovėse; Mekoje ir Medinoje rizikos nėra. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: C+P.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
SEIŠELIAI	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų arba per paskutines 6 dienas buvusių šiose teritorijose, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
SEN PJERAS IR MIKELONAS	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
SENEGALAS	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš endeminių teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Mažesnė rizika tik centriniuose vakarų regionuose sausio-birželio mėn. Registruotas atsparumas CHL sulfadoksinui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika: MEF.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija, poliomielitas.
SENT KRISTOFERIS IR NEVIS	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
SENT LIUSIJA	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Virusinis hepatitas A, virusinis hepatitas B.
SENT VINCENTAS IR GRENADINAI	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
SIERA LEONĖ	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika: MEF.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
SINGAPŪRAS	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų arba per paskutines 6 dienas buvusių šiose teritorijose, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
SIRIJOS ARABŲ RESPUBLIKA	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Ribota rizika gegužės-spalio mėn. ties šiaurine šalies siena, ypač šiaurės rytinėje

	dalyje. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: CHL.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
SLOVAKIJA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
SLOVĖNIJA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
SOMALIS	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika: MEF.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
SUDANAS	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato. Taip pat gali būti reikalaujama sertifikato iš keliautojų, išvykstančių iš šalies.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Labai maža rizika šalies šiaurėje, Raudonosios jūros pakrantėje, didesnė – Nilo pakrantėse į pietus nuo Nasero ežero bei centrinėje ir pietinėje šalies dalyje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika: MEF.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
SUOMIJA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
SURINAMAS	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus trijuose pietiniuose šalies rajonuose. Labai nedidelė rizika – Paramaribo mieste bei kitose pakrantės vietovėse. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: MEF.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
SVAZILANDAS	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visose žemumose. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: MEF.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
ŠIAURĖS MARIANOS SALOS	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė.
ŠRI LANKA	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje, išskyrus Kolombą, Kalutarą, Galle, Nuwara Eliya. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika: C+P.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B.
ŠV. ELENOS SALA	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
ŠVEDIJA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
ŠVEICARIJA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
TADŽIKISTANAS	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Maliarija. Rizika birželio-spalio mėn. ties pietine šalies siena, kai kuriose centrinėse (Dušambė), vakarinėse (Gorno-Badakšanas) ir šiaurinėse (Leninabado regionas) šalies teritorijose. Keliose vietovėse registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: C+P.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, poliomielitas.
TAILANDAS	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
	Maliarija. Rizika visus metus visos teritorijos, kaimo, ypač - miškingose vietovėse, taip pat šalies pasienyje. Rizikos nėra didžiuosiuose miestuose ir turistų dažniausiai lankomose vietovėse. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui – pirimetaminui, kai kuriose teritorijose – MEF. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose prie Kambodžos ir Mianmario sienų: DOX.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
TANZANIJA	Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo

	<p>geltonojo drugio. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus visose šalies teritorijose, esančiose žemiau 1800 m virš jūros lygio. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksiniui- pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika: MEF</i></p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija.</p>
TOGAS	<p>Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį būtina pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš visų vyresnių kaip 1 metų keliautojų reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika: MEF.</i></p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija, poliomielitas.</p>
TOKELAU	<p>Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė.</p>
TONGA	<p>Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė.</p>
TRINIDADAS IR TOBAGAS	<p>Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.</p>
TUNISAS	<p>Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
TURKIJA	<p>Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Maliarija. Rizika gegužės-spalio mėn. pietrytinėje šalies dalyje bei Amikova ir Çukurova lygumose. Nėra rizikos turistų lankomose vakarinės ir pietvakarinės šalies dalies teritorijose. <i>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: CHL.</i></p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
TURKMĖNIS-TANAS	<p>Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Maliarija. Maža rizika birželio-spalio mėn. keliuose pietrytinės šalies dalies kaimuose. <i>Profilaktika nerekomenduojama.</i></p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
TUVALU	<p>Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė.</p>
UGANDA	<p>Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš endeminių teritorijų, reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksiniui – pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika: MEF.</i></p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, poliomielitas, hepatitas B, meningokokinė infekcija.</p>
UKRAINA	<p>Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B, difterija.</p>
URUGVAJUS	<p>Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
UZBEKISTANAS	<p>Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Maliarija. Pavieniai atvejai buvo registruoti viename iš rajonų. <i>Profilaktika nerekomenduojama.</i></p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.</p>
VANUATU	<p>Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Maliarija. Maža ar vidutinė rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksiniui – pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika: C+P.</i></p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė.</p>
VEIKO SALA, JAV	<p>Nėra privalomų skiepavimų reikalavimų keliautojams.</p> <p>Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A.</p>
VENESUELA	<p>Geltonasis drugys. Endeminė teritorija. Vykstantiems į šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Privalomų skiepavimų reikalavimų nėra.</p> <p>Maliarija. Rizika visus metus kai kuriose kaimo vietovėse: <i>P. vivax</i> plitimas nustatytas Apure, Amazonas, Barinas, Bolívar, Sucre ir Táchira valstijose; <i>P. falciparum</i> - Amazonas (Atabapo), Bolívar (Cedeño, Gran Sabana, Raul Leoni, Sifontes and Sucre) ir Delta Amacuro (Antonia Diaz, Casacoima and Pedernales) džiunglių teritorijose. Registruotas atsparumas CHL Amazonės</p>

	valstijoje. <i>Rekomenduojama profilaktika: P.vivax rizikos teritorijose - CHL, P. falciparum rizikos teritorijose - MEF.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
VENGRIJA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Iš vyresnių kaip 1 metų keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų, reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
VIETNAMAS	Maliarija. Rizika visoje šalyje, išskyrus miestus, Red Riverio deltą ir pakrantės lygumą Centriniam Vietname. Didžiausia rizika – žemiau 1500 m virš jūros lygio esančiose teritorijose, ypač - Dak Lak, Gia Lai ir Kon Tum provincijose bei Ca Mau, Bac Lieu ir Tay Ninh provincijų pietinėse dalyse. Registruotas atsparumas CHL, sulfadoksinui - pirimetaminui. <i>Rekomenduojama profilaktika: MEF.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.
VIRGINŲ SALOS, JAV	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, hepatitas B.
VOKIETIJA	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
ZAIRAS	<i>Žr. Kongo Demokratinė Respublika.</i>
	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
ZAMBIJA	Maliarija. Rizika visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika: MEF.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B, meningokokinė infekcija.
	Geltonasis drugys. Iš keliautojų, atvykstančių iš endeminių teritorijų, reikalaujama skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikato.
ZIMBABVĖ	Maliarija. Rizika lapkričio-birželio mėn. teritorijose, esančiose žemiau kaip 1200 m virš jūros lygio ir visus metus Zambezės žemumoje. Registruotas atsparumas CHL. <i>Rekomenduojama profilaktika: MEF.</i>
	Kiti rizikos veiksniai (infekcijos). Hepatitas A, vidurių šiltinė, hepatitas B.

Literatūra:

<http://www.who.int/ith>

International travel and health. World Health Organization. Geneva, 2003.

Travelers' Health. National Center for Infectious Diseases, USA, 2001-2002.

Parengė:

Dalia Rokaitė, Nerija Kuprevičienė

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras, 2004.05.10